

常用植物檢疫燻蒸消毒處理基準--害蟲部份

植物及害蟲 種類	處理方法		
	濃度(g/m ³)	時間(小時)	溫度(°C)
附著或寄生於 蘋果、櫻桃、梨、杏、葡萄、油桃、桃、李 等之捲葉蛾、綠椿象、象鼻蟲、叩頭蟲及蝸類害蟲。	24	2.5	27-32
	32	2.5	21-26
	40	2.5	16-20
	48	2.5	10-15
附著或寄生於 栗子、橡子 之姬捲葉蛾及象鼻蟲類。	64	3	33-36
	64	4	27-32
	80	4	21-26
	80	5	16-20
	96	5	10-15
1. 附著或寄生於 蕈苔屬蔬菜 之外食性害蟲或潛葉類害蟲 2. 附著或寄生於 萵苣、菊苣 之外食性害蟲 3. 附著或寄生於 其他葉菜類 之外食性害蟲或潛葉類害蟲	32	2	≥21.1
	40	2	15.5~21.0
	48	2	10.0~15.4
	56	2	7.2~9.9
	64	2	4.4~7.1
附著或寄生於 芹菜 之外食性害蟲	24	2	≥26.7
	32	2	21.1~26.6
	40	2	15.5~21.0
	48	2	10.0~15.4
	64	2	4.4~9.9
附著或寄生於 洋蔥 之外食性害蟲、肉食性害蟲或潛葉類害蟲	32	2	≥32.2
	40	2	26.7~32.1
	48	2	21.1~26.6
	48	2.5	15.5~21.0
	48	3	10.0~15.4
	48	3.5	4.4~9.9
附著或寄生於溫室栽培之植物、切花、草本植物之體表面害蟲、潛葉蠅、薊馬、蝸類、介殼蟲、蚜蟲、粉蟲。(例：柑橘)	24	2	27-32
	32	2	21-26
	40	2	16-20
	48	2	10-15
附著或寄生於繁殖用 乾種子 體表面之害蟲。(例：缺證)	40	2.5	27-32
	48	2.5	21-26
	48	3	16-20
	48	3.5	10-15