

# 水稻重要害蟲雙窗口抗藥性管理用藥建議

		第一期						
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	
害蟲種類	育苗箱 插秧	14 天	34 天	45 天	53 天	64 天	78 天	120 天
		生長初期		分蘖期		孕穗期	抽穗期	齊穗期 乳熟期/收穫
大螟								
二化螟							16+1B 布芬大利松 <sub>21天</sub>	
三化螟								
瘤野螟	1 <sup>A</sup> 加保利/ 2 <sup>8</sup> 剋安勃/ 2 <sup>2</sup> 芬普尼/							
褐飛蝨								
斑飛蝨							4 <sup>A</sup> 益達胺 <sub>10天</sub>	
白背飛蝨								
黑尾葉蟬								
水象鼻蟲			1 <sup>A</sup> 加保扶 <sub>15天</sub>					

		第二期						
		七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
害蟲種類	育苗箱 插秧	10 天	22 天	30 天	40 天	51 天	71 天	100 天
		生長初期		分蘖期		孕穗期	抽穗期	齊穗期 乳熟期/收穫
大螟								
二化螟								
三化螟							1 <sup>B</sup> 拜裕松/ <sup>14</sup> 培丹/ <sup>1A</sup> 加保扶*	
瘤野螟	2 <sup>2</sup> 芬普尼/ 1 <sup>A</sup> 加保利/ 2 <sup>8</sup> 剋安勃		1 <sup>4+P,P2</sup> 撲殺培丹					
褐飛蝨			4 <sup>A</sup> 可尼丁/ <sup>3A</sup> 依芬寧/ <sup>1B</sup> 陶斯松*					
斑飛蝨							3 <sup>A</sup> 護賽寧/ <sup>1B</sup> 大利松/ <sup>4A</sup> 達特南*	
白背飛蝨								
黑尾葉蟬				大利松				
水象鼻蟲		1 <sup>4</sup> 培丹/ <sup>1A</sup> 免扶克/ <sup>4A</sup> 益達胺*						

\* 三年輪用藥劑

