

飛蟲葉蟬類水稻害蟲用藥整理

作用機制分類 農藥普通名稱 安全採收期



褐飛蝨

- 1A 免扶克 37天
- 1A 免敵克 15天
- 1A 滅克蝨 20天
- 1A 雙必蝨 20天
- 1B 陶毆松 7天
- 1A+1B 益保扶 20天
- 1A+1B 益丁滅蝨 15天
- 1A+1B 加馬治蝨
- 2B 芬普尼[◆]
- 3A 依芬寧 15天
- 4A 可尼丁 10天
- 4A 達特南 14天
- 4A 賽速安* 10天
- 9B 派滅淨 10天
- 9C 氟尼胺 28天



- 1A 必克蝨 15天
- 1A 治滅蝨
- 1A 滅爾蝨
- 1A 蝨必殺
- 1A 滅必蝨* 15天
- !A+1A 雙滅必蝨
- 1A 丁基滅必蝨 15天
- 1A 丁基加保扶 29天
- 1A 加保利 21天
- 1A 納乃得
- 1A 安丹
- 1B 毆殺松 10天
- 1B 陶斯松 21天
- 1B 大利松 21天
- 1B 繁米松
- 1A+3A 治滅寧



白背飛蝨

- 1A 加保扶 15天



- 1B 馬拉松
- 1B 賽達松 15天
- 3A 百滅寧 15天
- 3A 芬化利

黑尾葉蟬

斑飛蝨

- 4A 益達胺** 10天
- 16 布芬淨** 15天
- 16+1B 布芬大利松 15天
- 16+3A 布芬第滅寧 15天



- 3A 護賽寧 20天

紫色標注[◆]記號表示此藥劑僅能用於育苗箱，並可導致白背飛蝨上千倍抗藥性之風險。
 紅字標注**記號表示褐飛蝨會對此藥劑產生超過500倍抗藥性的風險，*為20-50倍抗藥性風險。
 此圖表僅列出藥劑之中文普通名稱，實際施用仍需依據政府公告資訊。
 請參閱農藥資訊服務網：<http://pesticide.baphiq.gov.tw>

行政院農委會動植物防疫檢疫局
 105農科-10.5.2-檢-B1計劃經費補助